

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

外用痔疾用薬

新雪の元S坐薬

 使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は使用しないこと

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 10日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること


《効能・効果》

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和

《用法・用量》

15歳以上：1回1個を肛門内に挿入する。

なお、1日3回まで使用できる。



《用法及び用量に関連する注意》

- (1) 小児には使用させないください。
- (2) 本剤が軟らかい場合には、しばらく冷やした後に使用してください。また、硬すぎる場合には、軟らかくなった後に使用してください。
- (3) 肛門にのみ使用してください。

《成分・分量》 本品 1個(1.65g)中

アミノ安息香酸エチル…………… 72mg

リドカイン…………… 38mg

酸化亜鉛……………200mg

トコフェロール酢酸エステル…………… 60mg

(添加物としてハードファット、BHT、香料を含有する)

《保管及び取扱い上の注意》

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までご連絡ください。

〒634-0815 奈良県橿原市大谷町182番地

株式会社 雪の元本店 お客様相談室

受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00

(土曜、日曜、祝日を除く)

TEL 0744-22-2440 FAX 0744-22-2406

製造販売元 株式会社 **雪の元本店**
奈良県橿原市大谷町182番地