

# 雪の元 ヂナンコーソフト

第2類医薬品

注入軟膏 痔疾用薬

抗炎症作用のあるセイヨウトチノキ種子エキスを始め、有効成分を軟膏状にして、使いやすい注入式容器に入れた痔疾用薬です。

## 痛み

局所麻酔作用のあるリドカインで痛み・かゆみを鎮めます。

## 血行改善

トコフェロール酢酸エステルで血行をよくし、酸化亜鉛で患部を保護します。

## はれ

抗炎症作用のあるセイヨウトチノキ種子エキスを始め、はれを抑えます。

- ご使用の前に入浴又はぬるま湯を用い、ガーゼなどで患部をきれいにしますと、一層効果的です。
- 排便時の痛みが激しい時は、1時間ほど前に注入しておきますと、排便時の痛みをやわらげ、便の通りをよくします。

### ⚠ 使用上の注意

#### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

#### 1. 次の人は使用しないこと

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

#### 🗨 相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

#### 2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
そ の 他	刺 激 感

まれに下記の高篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

#### 3. 10日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

## 〔効能・効果〕

塗布の場合：きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみはれ・出血・ただれの緩和  
 注入の場合：きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみはれ・出血の緩和

## 〔用法・用量〕

適量を取り肛門部に塗布するか、又は15歳以上1回1個を肛門部に挿入し、全量を注入する。1日3回まで使用できます。なお、一度塗布に使用したものは、注入には使用しないこと。

### 〔用法及び用量に関する注意〕

- (1) 小児には使用させないでください。
- (2) 肛門部にのみ使用してください。

## 〔成分・分量と作用〕

成分	1個(2.5g)中	主な働き
セイヨウトチノキ種子エキス	9.375mg(原生薬75mg)	炎症、はれをおさえます。
リドカイン	60.0mg	局所の痛み、かゆみをしずめます。
トコフェロール酢酸エステル	50.0mg	血行を改善し、うっ血を防ぎます。
アラントイン	20.0mg	傷の修復作用があり、治りを早めます。
酸化亜鉛	250.0mg	収れん作用があり、患部を保護します。
添加物として、サラシミツロウ、流動パラフィン、ミリスチン酸イソプロピル、ワセリンを含有します。		





## 〔養生訓〕

1. 毎日入浴する。(患部の清潔と血行の改善)
2. 野菜、海藻等繊維の多い食事にする。(便の量を増やし便をやわらかくし、便通を改善)
3. 香辛料は控えめにする。(排便時に患部を刺激する)
4. 深酒をつつしむ。(肛門に負担をかけ、患部のうっ血をまねく)
5. トイレは3分以内にすませ、あと必ず清拭する。

### 〔保管及び取り扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早くご使用ください。

## 〔使用方法及び治療のポイント〕

<p>①キャップを静かにはずしてください。</p> 	<p>②すべりをよくするため薬剤を少量出して先端部に塗ってください。</p> 	<p>③肛門に深く挿入し、容器内の薬剤が十分に注入されるように強く押し出してください。</p> <p>なるべく深く挿入して下さい。</p>  <p>内部に注入する場合</p>	<p>④適量を直接患部に塗るか、ガーゼなどにのぼして患部にあててください。</p>  <p>外部に塗布して使用する場合</p>
--	--	--	--

- 注入式のため、容器の中に少量残りますが、残量を見込んで薬剤は十分充填しており、必要量は、肛門内に注入されます。又、寒い時期、容器が多少硬くなりますが、手の中で暖めると出やすくなります。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までご連絡ください。

〒634-0815 奈良県橿原市大谷町182番地

株式会社 雪の元本店 お客様相談室

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00

(土曜、日曜、祝日を除く)

TEL 0744-22-2440 FAX 0744-22-2406

製造販売元 株式会社 雪の元本店  
 奈良県橿原市大谷町182番地